Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/74453

File ID	74453
Filename	Stellingen

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Type	Dissertation
Title	Interactions of BCG with urothelial tumor cells in immunotherapy for superficial bladder cancer
Author	R.F.M. Bevers
Faculty	Faculty of Medicine
Year	2004
Pages	126
ISBN	9090178619

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/202942

Copyright

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other then for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Stellingen

1 Het antitumor effect van BCG-blaasspoelingen tegen oppervlakkige blaastumoren kan gezien worden als een anti-BCG effect van het lichaam tegen met BCG, of delen hiervan, geïnfecteerde blaastumorcellen (dit proefschrift).

2 Adherentie en opname van BCG in blaastumorcellen is niet afhankelijk van fibronectine (dit proefschrift).

3 Opname van BCG in blaastumorcellen treedt met name in slecht gedifferentieerde cellen op (dit proefschrift).

4 Het tuberculostaticum isoniazide heeft geen invloed op de door BCG gestimuleerde IL-6 productie van blaastumorcellen (dit proefschrift).

5 De gouden standaard voor nefrectomie bij een niet-maligne aandoening is de laparoscopische nefrectomie.

6 Ziekenhuizen, die nieuwe en kostbare technieken toepassen - waardoor patiënten sneller herstellen - snijden in eigen vlees, zolang gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim uit aparte bronnen worden gefinancierd.

7 Hyperbare zuurstof behandeling heeft nut bij ernstige haemorrhagische radiatiecystitis (Bevers *et al.* Lancet 346: 803-805, 1995).

8 Patiënten met klachten ten gevolge van een syringocele (ductectasie van de glandula urethralis Cowper) dienen transurethraal behandeld te worden (Bevers *et al.* J Urol 163: 782-4, 2000).

9 Gezien de grote sociale gevolgen is het onjuist om absences als 'petit mal' te zien.

10 Door tastend op te treden bij scrotale zwellingen is echografisch onderzoek veelal overbodig.

11 De behoefte aan een second opinion is vaak terug te voeren op communicatieve problemen bij het eerste arts - patiënt contact.

12 De wet van Moore heeft fysieke grenzen.

13 Wangedrag van politici is de media niet te verwijten (ubi pus, ibi evacua).

Stellingen behorende bij het proefschrift *"Interactions of BCG with urothelial tumor cells in immunotherapy for superficial bladder cancer".*

Amsterdam, 14 april 2004 R.F.M. Bevers